aftex

SPRAY – GEL ORAL – COLUTORIO – PEDIATRICS – FORTE GEL ORAL

Alivia inmediatamente el dolor y promueve la curación de las úlceras bucales reduciendo su duración por su acción protectora
No contiene alcohol

Las úlceras bucales (aftas) son procesos inflamatorios que cursan con la aparición de lesiones dolorosas en la cavidad bucal. La fórmula patentada de **AFTEX** proporciona una intensa y duradera protección sobre la lesión, lo que permite una reducción inmediata del dolor y ayuda a acelerar los procesos naturales de curación, reduciendo el número de lesiones y rehidratando los tejidos, como se ha demostrado en ensayos clínicos controlados.

INDICACIONES
Úlceras bucales debidas a Estomatitis aftosa. Lesiones ulcerosas recurrentes en la boca (úlceras recurrentes y liquen plano) e irritaciones de la cavidad bucal.

MODO DE EMPLEO
SPRAY, GEL ORAL, PEDIATRICS Aplicar 2-3 veces al día o más según necesidad, después de las comidas, durante una semana o hasta la desaparición de los síntomas.

COLUTORIO En el caso de úlceras recurrentes, el uso continuado del colutorio puede ejercer una acción preventiva en toda la cavidad oral. Efectuar un enjuague con 10 ml de producto 2-3 veces al día o más según necesidad, después de las comidas, durante una semana o hasta la desaparición de los síntomas. El producto está listo para su uso. No diluir.

FORTE GEL ORAL Fórmula de alta densidad y concentración, específicamente estudiada para las aftas extensas y muy dolorosas. En las lesiones muy extensas debe cubrirse completamente toda la superficie de la úlcera. Repetir la aplicación 2-3 veces al día o más según necesidad, después de las comidas, durante una semana o hasta la desaparición de los síntomas.

En caso de dolor persistente, AFTEX puede ser aplicado con seguridad incluso más veces al día.

Se aconseja no comer ni beber al menos hasta 30 minutos después de la aplicación.

No se han reportado problemas después de la ingestión accidental del producto.

COMPOSICIÓN
SPRAY
Ingrediente principal: ácido hialurónico (sal sódica) de elevado peso molecular.
Otros componentes: Aqua, Xylitol, Propylene glycol, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Sodium benzoate, Aroma, Dichlorobenzyl alcohol, Sodium lactate, Sodium hydroxide, Lactic acid, Polyvinyl alcohol, Disodium EDTA, Sodium saccharin.

GEL ORAL
Ingrediente principal: ácido hialurónico (sal sódica) de elevado peso molecular.
Otros componentes: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Propylene glycol, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Sodium benzoate, Polivinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Sodium hydroxide, Dichlorobenzyl alcohol, Aroma, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090).
Puede contener: Lactic acid.

PEDIATRICS GEL ORAL
Ingrediente principal: ácido hialurónico (sal sódica) de elevado peso molecular.
Otros componentes: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Propylene glycol, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Glyceryl laurate, Polysorbate 20, Aroma, Carbomer (Polycarbophil), Sodium saccharin, Sodium lactate, Lactic acid, Disodium EDTA.
Puede contener: Sodium hydroxide.

COLUTORIO
Ingrediente principal: ácido hialurónico (sal sódica) de elevado peso molecular.
Otros componentes: Aqua, Xylitol, Propylene glycol, Polysorbate 20, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Sodium benzoate, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl alcohol, Sodium lactate, Aroma, Lactic acid, Disodium EDTA, Sodium hydroxide, Sodium saccharin, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090).

FORTE GEL ORAL
Ingrediente principal: ácido hialurónico (sal sódica) de elevado peso molecular.
Otros componentes: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl alcohol, PEG 40 Hydrogenated castor oil, PVP, Cellulose gum, Sodium benzoate, Sodium hydroxide, Carbomer (Polycarbophil), Sodium phosphate, Aroma, Dichlorobenzyl alcohol, Trisodium phosphate, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090).
Puede contener: Lactic acid.

ADVERTENCIAS
No utilizar en caso de hipersensibilidad individual conocida al producto. No usar el producto si está visiblemente dañado. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No usar después del periodo de validez. El período de validez se refiere al producto intacto y correctamente conservado. Después del uso, eliminar cualquier residuo del producto del envase antes de cerrarlo. Este producto es para uso personal. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES
AFTEX SPRAY Frasco con aplicador bucal, C.N. 200610.2
AFTEX GEL ORAL Tubo con cánula aplicadora, C.N. 328249.9
AFTEX PEDIATRICS GEL ORAL Tubo con cánula aplicadora, C.N. 215577.0
AFTEX COLUTORIO Frasco con tapón dosificador CE 0373, C.N. 150952.9 y C.N. 165748.0
AFTEX FORTE GEL ORAL Tubo con cánula aplicadora, C.N. 180649.9

AF4001-02/B/B
Release February 2024

Distribuido por:

Laboratorios Viñas
Provença 386 - 08025 Barcelona
ESPAÑA/SPAIN

Bioplax Italia Srl
Via G. Leopardi, 21
20123 Milano - Italy
www.bioplaxpharma.com

+5°C +40°C

CE 0051